


ACLARACIONES PARA LOS TRABAJADORES EN CUANTO A MASCARILLAS PARA EL COVID-19

Consideraciones generales

- La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria supone la primera medida de protección para el trabajador.
- En general, cuando se atienda a pacientes con sintomatología respiratoria a más de 2 metros de distancia, no se precisa protección respiratoria.
- No se recomienda reutilizar la mascarilla FFP cuando se han superado las 5 jornadas de uso, o sin superarse, cuando se ha usado en procedimientos con una cantidad importante de aerosoles, o está contaminada con secreciones. La mascarilla que se reutilice se manipulará con las manos limpias y se almacenará en una bolsa individual.

Flujograma



VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Resumen de las mascarillas a usar en Hospital según riesgo de exposición

1. Se utilizará mascarilla FFP3:
 - 1.1. En procedimientos sobre la vía aérea, en los que se generen aerosoles, como la intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, o la ventilación manual, etc.
 - 1.2. En la recogida de muestras que generan aerosoles.
 - 1.3. En el laboratorio cuando no sea posible realizar los procedimientos sobre muestras que puedan generar aerosoles de partículas finas dentro de la cabina de seguridad biológica.
2. Se utilizará mascarilla FFP2:
 - 2.1. En los casos descritos en el punto 1 cuando no se disponga de FFP3.
 - 2.2. Recogida de muestras clínicas que no generan aerosoles.
 - 2.3. Al prestar asistencia sanitaria en habitaciones de aislamiento sin realizar procedimientos que generen aerosoles.
3. Se utilizará mascarilla quirúrgica:
 - 3.1. En los casos descritos en el punto 1 cuando no se disponga de FFP3 ni FFP2.
 - 3.2. En los casos descritos en el punto 2 cuando no se disponga de FFP2.
 - 3.3. En los laboratorios, cuando se manipulen muestras clínicas rutinarias de pacientes (hemograma, análisis de orina, serología).
 - 3.4. Al entrar en habitaciones de aislamiento donde se presta atención sanitaria para la limpieza o entrega/recogida de bandejas, revisión de goteros o similar.
 - 3.5. En el traslado de pacientes con sintomatología respiratoria.

El personal que realice reparaciones de equipos y/o instalaciones dentro de la habitación del paciente llevará máscara con filtro P2/P3.